

MULHER



Allegra alivia a
alergia 2x mais
rápido*1 e sem
dar sono

R\$ **82,99**
Cada



R\$ **36,49**
Cada

*Rinite alérgica e urticária. Nas apresentações de 120mg e 180mg. Comparando o tempo médio para o início do alívio dos sintomas clinicamente importantes com loratadina 10mg. **Estudos não demonstraram associação do uso do produto com alteração no padrão do sono. ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza e, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS: 1.8620.0010. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 1- Greisner WA 3rd. Onset of action for the relief of allergic rhinitis symptoms with second-generation antihistamines. Allergy Asthma Proc. 2004 Mar-Apr;25(2):81-3. PMID: 15176489.6 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15176489/> 2- bula do produto. MAT-BR-2504099. SET/25.



DOR? 1
DEIXA COMIGO
DORFLEX ANALGÉSICO
Nº1 DO BRASIL2

R\$ **6,99**
Cada



R\$ **19,99**
Cada

Opella.

DORFLEX® (dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra). Indicações: no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. MS: 1.8620.0008. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 1 - Bula Dorflex. 2 - IQVIA FMB Valor PPP - Mar/2024 - Nº 1 em vendas. MAT-BR-2305113. ABR/24.

Farmácia
Super
Popular

**Parcele suas compras
em até 10x sem juros!**

Ofertas válidas no período, de 01/03/2026 a 31/03/2026 ou enquanto durarem os estoques, nas filiais da rede Super Popular. As promoções deste catálogo são válidas para compras no delivery e nas lojas físicas. Alguns produtos deste catálogo podem não estar disponíveis em todas as lojas.

**# Vem pra cá,
vem pra Super**

ifood
@superpopularofc

MAIS QUE UM MÊS. É UM COMPROMISSO DIÁRIO COM A SAÚDE DA MULHER.

Uma homenagem da EMS ao Mês da Mulher.



CLORIDRATO DE FEXOFENADINA

Medicamento Referência:
Allegra - Sanofi-Aventis

SUSPENSÃO ORAL DE 6 MG/ML.
EMBALAGEM CONTENDO UM FRASCO DE 60 ML+SERINGA DOSADORA

R\$ cada **23,99**



DIPIRONA MONOIDRATADA

Medicamento referência:
Novalgina - Sanofi-Aventis

CPR LG 1G C/10

R\$ cada **12,29**



ACETILCISTEÍNA

Medicamento referência:
Fluimucil - Zambon

GRANULADO 600MG
COM 16 ENV COM 5G

R\$ cada **41,49**



NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO

Medicamento Referência:
DERMODEX - TAKEDA

POMADA 100.000UI+200MG/G
BISNAGA C/ 60 G

R\$ cada **15,99**

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA

NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.

ACETILCISTEÍNA (Medicamento Referência: FLUIMUCIL - ZAMBON). Apresentação: GRANULADO 600MG COM 16 ENV COM 5G. Registro MS:1.0235.1342.010-4. Indicações: É um medicamento expectorante indicado quando se tem dificuldade para expectorar e há muita secreção densa e viscosa, tais como bronquite aguda, bronquite crônica e suas exacerbações (piora do quadro clínico e complicações), enfisema pulmonar (doença crônica caracterizada pelo comprometimento dos pulmões), pneumonia (inflamação nos pulmões e brônquios), colapso/atelectasias pulmonares (fechamento dos brônquios), mucoviscidose (doença hereditária que produz muco espesso, também conhecida por fibrose cística). Também é indicado para intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol. Contraindicações: A acetilcisteína é contraindicada para pacientes alérgicos a acetilcisteína e/ou demais componentes de suas formulações. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Não há contra-indicações para o tratamento de overdose de paracetamol com acetilcisteína. - Farm. resp.: Dra. Telma Elaine Spina, CRF-SP nº 22.234. EMS S/A. Rdv. Jornalista Francisco Aguirre Proença s/n km 8, Chacara Assay Hortolândia-sp. CEP 13186-901. CNPJ: 57.507.378.0003-65. Indústria brasileira. "Medicamento genérico, lei nº 9.787, de 1999". Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. LEIA A BULA.

DIPIRONA (Medicamento Referência: NOVALGINA - SANOFI-AVENTIS). Apresentação: CPR LG 1G C/10. Registro MS:1.0235.1391.002-0. Indicação: Este medicamento é indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre). Contraindicações: A dipirona não deve ser utilizada caso você tenha: - alergia ou intolerância à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolidonas (ex. fenazona, propifenazona) ou a pirazolidinas (ex. fenilbutazona, oxicfenbutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos do sangue) com uma dessas substâncias; - função da medula óssea prejudicada (ex. após tratamento citotático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguíneas); - desenvolvido broncoespasmo (contração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilatóides, como urticária (erupção na pele que causa coceira), rinite (irritação e inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas) depois do uso de medicamentos para dor (ex. salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno); - porfiria hepática aguda intermitente (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas) pelo risco de indução de crises de porfiria; - deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia). Não use este medicamento durante a gravidez e em crianças menores de três meses de idade. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Não use este medicamento durante a gravidez e em crianças menores de três meses de idade. - Farm. resp.: Dra. Telma Elaine Spina, CRF-SP nº 22.234. EMS S/A. Rdv. Jornalista Francisco Aguirre Proença s/n km 8, Chacara Assay Hortolândia-sp. CEP 13186-901. CNPJ: 57.507.378.0003-65. Indústria brasileira. "Medicamento genérico, lei nº 9.787, de 1999". Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. LEIA A BULA.

ACETILCISTEÍNA (Medicamento Referência: FLUIMUCIL - ZAMBON). Apresentação: GRANULADO 600MG COM 16 ENV COM 5G. Registro MS:1.0235.1342.010-4. Indicações: É um medicamento expectorante indicado quando se tem dificuldade para expectorar e há muita secreção densa e viscosa, tais como bronquite aguda, bronquite crônica e suas exacerbações (piora do quadro clínico e complicações), enfisema pulmonar (doença crônica caracterizada pelo comprometimento dos pulmões), pneumonia (inflamação nos pulmões e brônquios), colapso/atelectasias pulmonares (fechamento dos brônquios), mucoviscidose (doença hereditária que produz muco espesso, também conhecida por fibrose cística). Também é indicado para intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol. Contraindicações: A acetilcisteína é contraindicada para pacientes alérgicos a acetilcisteína e/ou demais componentes de suas formulações. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Não há contra-indicações para o tratamento de overdose de paracetamol com acetilcisteína. - Farm. resp.: Dra. Telma Elaine Spina, CRF-SP nº 22.234. EMS S/A. Rdv. Jornalista Francisco Aguirre Proença s/n km 8, Chacara Assay Hortolândia-sp. CEP 13186-901. CNPJ: 57.507.378.0003-65. Indústria brasileira. "Medicamento genérico, lei nº 9.787, de 1999". Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. LEIA A BULA.

NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO (Medicamento Referência: DERMODEX - TAKEDA). Apresentação: POMADA 100.000UI+200MG/G BISNAGA C/ 60 G. Registro MS:1.0235.1284.001-0. Indicações: indicação principal para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. Além dessa indicação, pode ser usada em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito. Contraindicações: não deve ser utilizada se você for alérgico à nistatina, ao óxido de zinco ou aos demais ingredientes do produto. - Farm. resp.: Dra. Telma Elaine Spina, CRF-SP nº 22.234. EMS S/A. Rdv. Jornalista Francisco Aguirre Proença s/n km 8, Chacara Assay Hortolândia-sp. CEP 13186-901. CNPJ: 57.507.378.0003-65. Indústria brasileira. "Medicamento genérico, lei nº 9.787, de 1999". Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. LEIA A BULA.

Ofertas válidas no período de 01/03/2026 a 31/03/2026 ou enquanto durarem os estoques, nas filiais da rede Super Popular. As promoções deste catálogo são válidas para compras no delivery e nas lojas físicas. Alguns produtos deste catálogo podem não estar disponíveis em todas as lojas.

ifood @superpopularofo

Repoflor®

PARA TODO TIPO DE DIARREIA

A vida acontece
fora do banheiro.

- AUXILIA NO TRATAMENTO DA DIARREIA
- RESTAURA A FLORA INTESTINAL



REPOFLOR® (Saccharomyces boulardii). Cápsula dura 100 mg. Embalagem contendo 12 unidades. Cápsula dura 200 mg. Embalagem contendo 6 unidades. USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. REPOFLOR® (Saccharomyces boulardii). Pó oral 200 mg/g. Embalagem contendo 4 envelopes de 1g. USO ORAL. USO PEDIÁTRICO. REPOFLOR® 250 (Saccharomyces boulardii). Cápsula dura 250 mg. Embalagem contendo 6, 10 ou 12 unidades. Pó oral 250 mg. Embalagem contendo 6 ou 10 envelopes de 800 mg. USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. INDICAÇÕES: é indicado na restauração da flora intestinal fisiológica e auxiliar no tratamento da diarreia causada pelo Clostridium difficile, em decorrência do uso de antibióticos e quimioterápicos. Reg. MS. nº 1.0235.0420. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. O PRODUTO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E/OU FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. mb-000910-EMS-v0. Agosto/2024.

Legrand

Vitamina D é althaia

Disponível em diversas
concentrações e apresentações



VITAMINA D3
7000UI C/4 CP

R\$ 10,75
cada

Medley. GENÉRICO TEM MARCA



R\$ 10,79
cada



R\$ 14,65
cada



Neutrogena®

RECOMENDADA POR DERMATOLOGISTAS

POTENCIALIZA A VITALIDADE DA SUA PELE



PROT. SOLAR
NEUTROGENA SUN
FRESH S/COR BOOST
FPS50 40ML

R\$ **67,90**
cada



PROT. SOLAR
NEUTROGENA
DERM CARE OIL
SKIN S/C FPS70 40G

R\$ **58,90**
cada



PROT. SOLAR
NEUTROGENA SUN
FRESH FPS50 200ML

R\$ **69,90**
cada

Neutrogena

RECOMENDADA POR DERMATOLOGISTAS

POTENCIALIZA A VITALIDADE DA SUA PELE



NEUTROGENA®
Body Care
Hidrata e Repara
ou Hidrata e Suaviza
400 ml

R\$ **29,90**
cada

HIDRATA INTENSAMENTE POR 48H



D PANTENOL



HIDRATAÇÃO
EXTRA



Johnson's

Marca **#1** no
mundo* em cuidados
para bebês e crianças.

100% livre de álcool,
corantes e sulfatos.**

Shampoo
Glicerina
400 mL

R\$ **19,90**
cada



Sabonete
Glicerina
400 mL

R\$ **31,90**
cada

*Fonte Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care edição 2023, de acordo com as definições da categoria de produtos específicos para criança e bebê; todos os canais de varejo; vendas em valor a preços no ponto de venda; dados de 2022. **Entre 80% do mercado e em toda a linha de sabonetes líquidos e shampoos.

Ofertas válidas no período de 01/03/2026 a 31/03/2026 ou enquanto durarem os estoques, nas filiais da rede Super Popular. As promoções deste catálogo são válidas para compras no delivery e nas lojas físicas. Alguns produtos deste catálogo podem não estar disponíveis em todas as lojas.

Bionatus
Pharmaceuticals



FAZ SUA VIDA MELHOR



RESSACA



DOR DE CABEÇA

A MISTURA QUE É HIT DO VERÃO

COM ESTE COMBO, A CURTIDÃO NÃO PARA.



AZIA E MÁ DIGESTÃO



MAL-ESTAR DO FÍGADO

STOMALIV®

Quando
a Comida
NÃO CAI
BEM!



R\$ 01,19
cada



R\$ 01,19
cada

Acu Fresh®

Uma visão
de conforto.

Lubrificante ocular para
melhora da irritação,
ardor e secura dos
olhos. Re-umidificante
durante o uso de lentes
de contato para alívio
do ressecamento.



R\$ 19,99
cada

Helioderm
dermocosméticos

R\$ 21,99
cada



R\$ 65,99
cada



R\$ 17,99
cada



Farmácia
Super
Popular

**Parcele suas compras
em até 10x sem juros!**

Ofertas válidas no período de 01/03/2026 a 31/03/2026 ou enquanto durarem os estoques, nas filiais da rede Super Popular. As promoções deste catálogo são válidas para compras no delivery e nas lojas físicas. Alguns produtos deste catálogo podem não estar disponíveis em todas as lojas.

**# Vem pra cá,
vem pra Super**

ifood Instagram WhatsApp Spotify
@superpopularofc

Dentalclean



volta às aulas



Escova Escolar
Stitch

R\$ **14,99**
cada



Escova Juvenil
Stitch Macio L2PE

R\$ **26,99**
cada



Escova Adulto
Stitch Macio L2PE

R\$ **26,99**
cada



Kit Premium
Infantil Stitch

R\$ **32,99**
cada



Kit Premium
Adulto Stitch

R\$ **33,99**
cada



Enxaguante Antisséptico
Stitch 300 ml

R\$ **15,99**
cada



Gel Dental
Stitch 104g

R\$ **14,99**
cada



Flosser infantil
Stitch Morango

R\$ **31,99**
cada

**Promovendo acesso a pacientes
em mais de 100 países.**



DESCRIÇÃO DO PRODUTO/	MS	FABRICANTE	PATOLOGIA	DE:	POR:
BESILATO DE ANLIDIPINO 10 MG C/ 30 CP	1004705570061	SANDOZ	ANTIHIPERTENSIVO	R\$ 70,02	R\$ 16,99
DESGESTREL 0,075MG CX 28 COMP	1004705170010	SANDOZ	ANTICONCEPCIONAL	R\$ 35,38	R\$ 17,99
ATENOLOL 25 MG C/ 30 CP	1004703630030	SANDOZ	ANTIHIPERTENSIVO	R\$ 21,00	R\$ 3,99
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/ 28 CP REV	1004704240082	SANDOZ	ANTICOAGULANTE	R\$ 57,06	R\$ 22,99
VITAMINA E 400MG C/60CP	1.0047.0399	SANDOZ	ANTIOXIDANTE	-	R\$ 58,29

SANDOZ

Medicamento Genérico Lei nº 9.787/99. Referências: 1 - CBPF publicado no DOU em 15/07/2024. Resolução RE Nº 2555, de 11 de julho de 2024. 2. PMC ICMS 12% - Revista ABC Farma Novembro/2025. BR2503078091 - MAR/25



Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Antônio Rosário Filho (Marginal da R445), 1920
Parque Industrial José Garcia Cimenas
CEP: 86183-751 - Cambé / PR - Brasil

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/	MS	FABRICANTE	PATOLOGIA	DE:	POR:
DIPIRONA SODICA 1G C/ 10CP	1558403250039	NEOQUIMICA	ANALGÉSICO	R\$ 23,99	R\$ 11,99
SIMETICONA 125MG C 10CPS	ISENTO	UNIAO QUIMICA	ANTIGASES	R\$ 11,99	R\$ 5,99
ALGY-FLANDERIL 600MG C/30 CP (IBUPROFENO 600MG)	1039200650123	VITAMEDIC	ANTITINFLAMATORIO	R\$ 53,93	R\$ 14,99
RESFEGRIPE 20CPS	1181902680011	MULTILAB	ANTIGRIPAL	R\$ 22,80	R\$ 11,99
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG C/ 30 CP REV(ALT)	1351700410103	ALTHAIA	DISLIPIDEMIA	R\$ 83,11	R\$ 29,99

ATENOLOL 25 MG C/ 30 CP	1004703630030	SANDOZ	ANTIHIPERTENSIVO	R\$ 21,00	R\$ 3,99
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/ 28 CP REV	1004704240082	SANDOZ	ANTICOAGULANTE	R\$ 57,06	R\$ 22,99
CITRATO DE SILDENAFILA 50 MG C/ 4 CP	1558401450103	NEOQUIMICA	DISFUNÇÃO ERÉTIL	R\$ 8,37	R\$ 5,99
LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 CP REV(EMS)	1023508100547	EMS	ANTIHIPERTENSIVO	R\$ 20,50	R\$ 4,99
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP	1058302390089	GERMED	ANTIHIPERTENSIVO	R\$ 9,12	R\$ 5,99
SINVASTATINA 20MG C/30 CP	1004704720505	SANDOZ	DISLIPIDEMIA	R\$ 17,06	R\$ 9,99
TADALAFILA 5 MG C/ 30 CP	1023511340049	EMS	DISFUNÇÃO ERÉTIL	R\$ 111,41	R\$ 24,99
TADALAFILA 20MG C 4 CP REV	1023511340091	EMS	DISFUNÇÃO ERÉTIL	R\$ 39,87	R\$ 15,99

**LEVE 3
PAGUE
R\$0,01
NA 4ª
CAIXA**
**PROMOÇÃO VALIDA
SOMENTE NA 4ª
UNIDADE DO PRODUTO**

ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG COM 30CP. REG. M.S 1351700410103. INDICAÇÃO: ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. | DIPIRONA SÓDICA 1G COM 10 COMPRIMIDOS (DIPIRONA SÓDICA). REG. M.S 1558403250039. INDICAÇÃO: ANALGÉSICO E ANTITÉRMICO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE | RESFEGRIPE 400 + 4 + 4MG COM 20 CÁPSULAS (PARACETAMOL + MALEATO DE CLORFENAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA). REG. M.S 1181902680011. INDICAÇÃO: ANTIGRIPAL. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, PRESSÃO ALTA E GLAUCOMA. | ATENOLOL 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS (ATENOLOL). REG. M.S 1004703630030. INDICAÇÃO: ANTIHIPERTENSIVO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM ASMA, HIPOTENSÃO, DOENÇA RENAL, BRADICARDIA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COM 28 COMPRIMIDOS REVESTIDOS (BISSULFATO DE CLOPIDOGREL). REG. M.S 1004704240082. INDICAÇÃO: ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM ÚLCERA PÉPTICA OU HEMORRAGIA INTRACRANIANA. | LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS (LOSARTANA POTÁSSICA). REG. M.S 1023508100547. INDICAÇÃO: ANTI-HIPERTENSIVO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DO PRODUTO. QUANDO UTILIZADAS DURANTE O SEGUNDO E O TERCEIRO TRIMESTRES DA GRAVIDEZ, AS DROGAS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA PODEM CAUSAR DANOS E ATÉ MORTE DO FETO EM DESENVOLVIMENTO. | MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COM 30 COMPRIMIDOS (MALEATO DE ENALAPRIL). REG. M.S 1058302390089. INDICAÇÃO: ANTI-HIPERTENSIVO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: ENALAPRIL NÃO PODE SER ADMINISTRADO EM PACIENTES COM HISTÓRICO DE REAÇÃO ALÉRGICA AOS IECAS, NA GRAVIDEZ, NA LACTAÇÃO E NA ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL. | ALGY-FLANDERIL 600MG COM 30 COMPRIMIDOS (IBUPROFENO). REG. M.S 1039200650123. INDICAÇÃO: ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-ESTEROIDE. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS. | SIMETICONA 125 MG COM 10 CÁPSULAS (SIMETICONA). REG. M.S RDC 199/2006 AFE Nº 1.00497-7. INDICAÇÃO: ANTIFLATULENTO. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 199/2006 AFE Nº 1.00497-7 | SINVASTATINA 20MG COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS (SINVASTATINA). REG. M.S 1004704720114. INDICAÇÃO: ANTILIPÊMICO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: É CONTRAINDICADO EM CASO DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO DOENÇA HEPÁTICA ATIVA OU ELEVACOES PERSISTENTES E INEXPLICADAS. PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE MIOPATIAS TRANSAMINASES SÉRICAS, TERAPIA CONCOMITANTE COM O BLOQUEADOR DO CANAL DE CÁLCIO DA CLASSE DOS TETRALOL, O MIBEFRADIL. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO. | DIPIRONA SÓDICA 1G COM 10 COMPRIMIDOS (DIPIRONA SÓDICA). REG. M.S 1558403250039. INDICAÇÃO: ANALGÉSICO E ANTITÉRMICO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE | BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG 30 CP. REG. M.S 1004705570061. INDICAÇÃO: HIPERTENSÃO (PRESSÃO ALTA) E ANGINA DE PEITO (DOR NO PEITO, POR DOENÇA DO CORAÇÃO) DEVIDO À ISQUEMIA MIOCÁRDICA (FALTA DE SANGUE NO CORAÇÃO). TENHA CUIDADO, LEIA A BULA, A AUTOMEDICAÇÃO PODE COLOCAR A SUA SAÚDE EM RISCO. SÓ USE MEDICAMENTOS COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E/OU FARMACÊUTICA. | DESOGESTREL 0,075MG 28 CP. REG. M.S 1004705170010. INDICAÇÃO: O DESOGESTREL É USADO PARA EVITAR A GRAVIDEZ. CONTRAINDICAÇÃO: ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA USO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE SUSPEITAM QUE POSSAM ESTAR GRÁVIDAS. | CITRATO DE SILDENAFILA 50MG C/ 4 CP. REG. M. S 1728703990179. INDICAÇÃO: TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL, QUE SE ENTENDE COMO SENDO A INCAPACIDADE DE OBTER OU MANTER UMA EREÇÃO (RIGIDEZ DO PÊNIS) SUFICIENTE PARA UM DESEMPENHO SEXUAL SATISFATÓRIO. CONTRAINDICAÇÃO: CONTRAINDICADO PARA USO POR PACIENTES EM TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM QUALQUER FORMA DOADORA DE ÓXIDO NÍTRICO, NITRATOS ORGÂNICOS OU NITRITOS ORGÂNICOS. A COADMINISTRAÇÃO DE INIBIDORES DA PDES, INCLUINDO O CITRATO DE SILDENAFILA, COM ESTIMULADORES DA GUANILATO CICLASE, TAIS COMO RIOCIGUATE, ESTÁ CONTRAINDICADA, UMA VEZ QUE PODE POTENCIALMENTE LEVAR A HIPOTENSÃO SINTOMÁTICA. EM CASO DE DÚVIDA SE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ USANDO É UM MEDICAMENTO QUE CONTENHA ESSAS SUBSTÂNCIAS, CONSULTE SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO. VOCÊ TAMBÉM NÃO DEVE USAR O CITRATO DE SILDENAFILA SE TIVER HIPERSENSIBILIDADE (REAÇÃO ALÉRGICA) CONHECIDA AO CITRATO DE SILDENAFILA OU A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA USO POR MULHERES. ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA MENORES DE 18 ANOS. |TADALAFILA 20MG COM 4 COMPRIMIDOS REVESTIDOS (TADALAFILA). REG. M.S 1023511340091. TADALAFILA 5MG COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS (TADALAFILA). REG. M.S 1023511340049. INDICAÇÃO: TERAPÊUTICA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO: A TADALAFILA NÃO DEVE SER ADMINISTRADA A PACIENTES QUE ESTEJAM UTILIZANDO MEDICAMENTOS CONTENDO NITRATOS. ESTES SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.